



réfléchie et sécurisée

Recommandations de phase 3 pour nous ophtalmologistes (au 15-03-2020)

• S'appuie sur les recommandations nationales

- Limiter au maximum les circulations et les rassemblements de population
- o Protéger les plus vulnérables
- o Favoriser la distanciation sociale
- Se protéger ...tenant compte des porteurs sains et des incubations lentes

Même s'il n'est pas imposé de stopper l'activité ophtalmologique Selon DGS, mais varie selon ARS, privé-public

Ophtalmologie:

- Concentration de patients
- Population souvent âgée
- Proximité d'examen < 1 m
- Transmission conjonctivale

cubations lentes

Il ne s'agit pas de fermer les cabinets

Mais de travailler en activité minimale

 Masques (pour toute l'équipe)

Ne pratiquer que si :

- Désinfection répétée
- Distance entre patients
- Salles d'attente fluides

• Fait appel à votre devoir médical

- Obligation d'assistance de nos patients
- o Engagement dans les actions de protection et d'éducation sanitaire
- Prise en charge des urgences

En votre âme et conscience : sélectionner ce qui doit décemment être maintenu

- Consultations
- IVT
- Blocs

- Encourager l'annulation si non urgence
- Maintenir accueil :
 Baisse vision +/- douleur +/- rougeur
- Accompagnant reste dehors
- Espacer RDV et distance inter-patients
- Masque patient et soignant

- Différer si possible le non urgent
- Maintenir l'urgent : DR, traumato, infectieux
- Veiller à libérer respirateurs et lits de salle de réveil
 - Fait appel à votre civisme
 - Objectif: limiter à tout prix la diffusion du virus
 - Sans limite d'âges
 - Apporter soutien à la crise sanitaire

Confinement : le seul moyen utile Pour : atténuer et étaler le pic Augmenter les chances de prise en charge des cas sévères

- Par téléphone ou en rencontre protégée
- Rassurer, conseiller, orienter
- Soutien aux généralistes
- Collaboration Privé-Public pour la gestion des flux

Les 2 semaines à venir seront décisives Et conduiront à adapter les CAT et leur durée